













Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

RIPOSO VEGETATIVO

INIZIO RISVEGLIO VEGETATIVO

PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE, CONCIMAZIONE, POTATURA "Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

28-02-2025

Prossimo bollettino 14-03-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SERINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Queste settimane sono state segnate da un'alternanza di condizioni meteorologiche instabili: si è verificato un breve ritorno del freddo invernale, seguito da precipitazioni e temperature più miti. Al momento, tutte le varietà si trovano ancora nella fase **iniziale della ripresa vegetativa**. Non si sono ancora ritrovati in campo insetti fitofagi. Le condizioni climatiche umide e le temperature miti di queste settimane stanno **favorendo la diffusione** di malattie fungine, come l'**occhio di pavone (Spilocaea oleaginea).**

L'inizio anticipato della stagione vegetativa desta preoccupazione poiché l'apertura delle gemme espone la pianta ai ritorni di freddo, aumentando la probabilità di incorrere in danni causati dal gelo. Il risveglio anticipato delle gemme causa timore poiché un'alterazione nei naturali processi fisiologici della pianta può causare **problemi** soprattutto sulla **differenziazione** delle **gemme a fiore** con conseguenze quali fioritura scalare, fiori malformati e fiori sterili.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Nel caso ce ne fosse bisogno si consiglia agli olivicoltori di far eseguire le analisi del terreno per stabilire un piano di concimazione ideale per le piante. In questa fase, è preferibile concentrarsi **sull'apporto di fosforo e potassio**, eventualmente **integrato con concimi organici** come compost, letame maturo o stallatico. È invece **sconsigliabile** utilizzare **concimi azotati a pronto effetto**.

Si consiglia di **continuare con la potatura** avendo sempre l'accortezza di **disinfettare gli strumenti** di potatura nel passaggio tra una pianta e l'altra, per evitare di propagare la rogna dell'olivo. Questa pratica è molto importante soprattutto dove sono presenti varietà d'olivo molto suscettibili a questo batterio come la Casaliva.

CONSIGLI AGRONOMICI

Viste le condizioni climatiche e l'umidità che favoriscono la diffusione delle malattie fungine, si raccomanda di **effettuare i trattamenti preventivi di copertura a breve**, subito dopo il completamento della potatura. Si consiglia di **adottare una strategia di intervento frazionata**, applicando i trattamenti rameici (come poltiglia bordolese, ossicloruri di rame, idrossido di rame o solfato di rame tribasico) man mano **che si conclude** la potatura di **singole parcelle o gruppi di piante.**

Questa prassi consente di ottimizzare la gestione degli interventi fitosanitari, massimizzando la protezione delle piante.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Segni d'infezione da occhio di pavone-AREALE GARDA























Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo è ancora riposo vegetativo

Da un punto di vista climatico, nelle ultime settimane si è registrato un **clima tipicamente primaverile**, caratterizzato da un **incremento delle temperature minime e medie**. Dalle osservazioni effettuate in campo emerge che i **casi di filloptosi** causati da patologie fungine, in particolare dalle infezioni di **occhio di pavone (***Spilocaea oleaginea***)**, sono ancora **poco diffusi.** Si continuano a rinvenire in campo gli **adulti di cimice asiatica** che stanno uscendo dalla **fase di svernamento**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare con le potature.

È possibile continuare con le concimazioni organiche utilizzando compost o letame ben maturi, mentre per le concimazioni minerali è opportuno attendere.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda che, **dopo la potatura**, è buona pratica **eseguire un trattamento rameico** (ossicloruri di rame, idrossido di rame o poltiglia bordolese) per **prevenire** o **ridurre il rischio di infezioni fungine e batteriche**.

CONSIGLI D'INTERVENTO























Como-lecco

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: inizio ripresa vegetativa

Le temperature miti di queste settimane stanno ancora favorendo **una ripresa anticipata dell'attività vegetativa** delle piante. Questo le rende **più vulnerabili** a eventuali **danni da gelo** in caso di ritorni di freddo invernale. Al momento, **non si osservano problematiche specifiche**, poiché i principali patogeni e parassiti della coltura non sono ancora attivi

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si può proseguire con le concimazioni al suolo utilizzando concimi granulari a base di fosforo e potassio, garantendo così la giusta disponibilità di nutrienti durante la stagione vegetativa. In questo periodo è anche possibile iniziare la potatura. Per la forma di allevamento, si raccomanda vivamente l'adozione del vaso policonico semplificato, che permette di raggiungere un equilibrio vegeto-produttivo ottimale, bilanciando le esigenze fisiologiche della pianta con la praticità delle operazioni in campo.

CONSIGLI AGRONOMICI

Dopo un intervento di potatura, è opportuno eseguire un trattamento rameico utilizzando ossicloruro di rame o poltiglia bordolese, al fine di prevenire lo sviluppo di funghi fogliari e ridurre il rischio di infezioni batteriche, come ad esempio la rogna.

CONSIGLI D'INTERVENTO









