

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

RISVEGLIO VEGETATIVO

PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE,
EUZOPHERA,
CONCIMAZIONE,
POTATURA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

14-03-2025

Prossimo bollettino 29-03-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Queste settimane sono state segnate da un alternarsi di giornate di pioggia e giornate soleggiate, con temperature miti. Tutte le varietà si trovano ora nella fase **di ripresa vegetativa**. Tra i fitofagi si segnala soprattutto su casaliva la presenza di **larve e crisalidi di *Euzophera spp.*** Le condizioni climatiche umide e le temperature miti di queste settimane stanno **favorendo la diffusione** di malattie fungine, come l'**occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*)**.

Con il **Decreto n. 3263 del 12/03/2025**, emesso dalla Regione Lombardia, la Regione introduce misure fitosanitarie speciali riguardanti la **combustione del materiale derivante dalle potature degli olivi** al fine di proteggere l'areale olivicolo lombardo da organismi nocivi. Si ricorda che la direttiva **non sostituisce le normative relative ai PM10 e alle altre leggi nazionali**. Pertanto, nei prossimi bollettini verranno fornite indicazioni più dettagliate per consentire agli olivicoltori di svolgere le operazioni in sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali vigenti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si raccomanda agli olivicoltori, qualora necessario, di effettuare **analisi del terreno** per definire un **piano di concimazione ottimale** per le piante. In questa fase, è ancora preferibile focalizzarsi sull'apporto di fosforo e potassio, eventualmente arricchito con concimi organici come compost, letame ben maturo o stallatico. Al contrario, è sconsigliato l'uso di concimi azotati a rilascio immediato.

Proseguire con la potatura, prestando particolare attenzione a disinfettare gli attrezzi di potatura ogni volta che si passa da una pianta all'altra. Questa precauzione è fondamentale per prevenire la diffusione della rogna dell'olivo, specialmente nelle aree dove sono presenti varietà più sensibili a questo batterio, come la Casaliva.

CONSIGLI AGRONOMICI

Visto il persistere delle condizioni climatiche (temperature miti e alta umidità) che favoriscono la diffusione delle malattie fungine, si continua a raccomandare di **effettuare i trattamenti preventivi di copertura a breve**, subito dopo il completamento della potatura. Si ricorda ancora che è preferibile adottare **una strategia di intervento frazionata**, applicando i trattamenti rameici (come poltiglia bordolese, ossicloruri di rame, idrossido di rame o solfato di rame tribasico) man mano **che si conclude** la potatura di **single parcelle o gruppi di piante**.

Questa prassi consente di **ottimizzare la gestione degli interventi fitosanitari, massimizzando la protezione delle piante**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Segni d'infezione da occhio di pavone-AREALE GARDA



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo è ancora **risveglio vegetativo**

Negli ultimi giorni si è osservato un **clima tipicamente primaverile**, con un **aumento delle temperature minime e medie** e **precipitazioni piuttosto frequenti**. Dalle osservazioni condotte in campo risulta che i casi di **filloptosi legati a patologie fungine**, in particolare alle infezioni da **occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)**, sono ancora **limitati** e non molto diffusi, anche se le condizioni meteo sono predisponenti. Si segnala ancora la presenza in campo gli **adulti di cimice asiatica** che stanno uscendo dalla **fase di svernamento**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare con le potature.

È **possibile continuare** con le **concimazioni organiche** utilizzando **compost o letame ben maturi**, mentre per le concimazioni minerali è opportuno attendere.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda che, **dopo la potatura**, è buona pratica **eseguire un trattamento rameico** (ossicloruri di rame, idrossido di rame o poltiglia bordolese) per **prevenire** o **ridurre il rischio di infezioni fungine e batteriche**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **ripresa vegetativa**

Le piogge abbondanti di questi giorni favoriscono lo sviluppo di agenti fungini e la movimentazione dei batteri sulla pianta. Gli insetti parassiti stanno cominciando ad uscire dai ricoveri invernali, ma al momento non costituiscono un problema per la coltura.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si raccomanda di **interrompere le operazioni di potatura** quando **la chioma è bagnata**, per **evitare di favorire nuove infezioni di rogna**. Inoltre, quando si provocano nuovi tagli o ferite sulla pianta, è **consigliato effettuare un trattamento rameico, per bloccare il più possibile il movimento di questi batteri patogeni**.

In questa fase si invita a **concludere nel breve tempo le operazioni di concimazione minerale** con **elementi poco mobili nel terreno**, come ad **esempio potassio, fosforo, magnesio e calcio**, mentre è possibile **cominciare a fornire azoto a lenta cessione**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Dopo un intervento di **potatura**, è opportuno eseguire un **trattamento rameico** utilizzando **ossicloruro di rame o poltiglia bordolese**, al fine di prevenire lo sviluppo **di funghi fogliari** e ridurre il **rischio di infezioni batteriche**, come ad esempio la **rogna**.

CONSIGLI D'INTERVENTO